

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-8-66 528913

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 5273.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel

~~XXX~~ 25 F

- Supplément n° 1 au bulletin n° 71 -

1966 - 22

- A V E R T I S S E M E N T S -

ARBRES FRUITIERS

• Carpocapse (Ver des pommes et des poires)

Le second vol de papillons se poursuit et des pontes parfois nombreuses sont déposées. Il y a donc intérêt à effectuer un nouveau traitement soigné dès que possible en respectant scrupuleusement la législation sur les limites d'emploi des produits.

• Tordeuse orientale du pêcher (protection des fruits à pépins) :

Le passage des adultes des vergers de fruits à noyau aux vergers de fruits à pépins voisins est en cours depuis un certain temps. Des pontes ont déjà été observées sur des poires et sur des coings.

Lorsque le verger de fruits à pépins est situé à proximité de pêchers, employer pour lutter contre le Carpacapse un insecticide efficace contre les deux ravageurs en utilisant la dose homologuée pour la Tordeuse Orientale.

- I N F O R M A T I O N S -

• Cératite ou Mouche des fruits :

Les captures de cette mouche se poursuivent, peu nombreuses, aux abords des agglomérations.

Pour les vergers situés dans ces conditions, il serait prudent d'envisager une protection des fruits à récolter dans le mois à venir.

CULTURES LÉGUMIÈRES

• Melon :

Dans les cultures tardives, effectuer dès la première menace de pluie un traitement mixte avec un produit à base de Manèbe et un anti-Oïdium.

• Mouche des semis (sur épinard et Mâche) :

Traiter les semences par enrobage avec l'un des produits suivants :

• 2,5 g de M.A. pour 10 K de graines : Aldrine, Lindane

• 5 g de M.A. pour 10 K de graines : Chlordane

• 4 g de M.A. pour 10 K de graines : Heptachlore

• Septoriose du céleri :

Effectuer une nouvelle application.

P. 1. 106

• Mouche de l'oignon et charbon :

On protégera les semis d'oignon blanc par le traitement des semences avec un produit à base soit de Diéthion, soit de Carbophénouthion. Contre le charbon, on ajoutera un produit à base de Thirame à raison de 56 g. de matière active par kilogramme de semence.

• Teigne du poireau :

Une attaque est actuellement en cours. Employer pour combattre ce ravageur un produit à base d'ester phosphorique et mouiller abondamment.

TOULOUSE, le 17 AOUT 1966

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du MIDI
Le Directeur - Gérant : L. BOUYX